

Крок М Лікувальна справа

4.0 Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики

1

Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

- A** *2,25-2,5 ммоль/л
- B** 1-1,5 ммоль/л
- C** 1,75-2,0 ммоль/л
- D** 2,5-2,75 ммоль/л
- E** 2,75-3,0 ммоль/л

2

Вкажіть, які харчові продукти вводять дитині на природному годуванні з метою введення вітамінів:

- A** *Яблучний сік
- B** Білок курячого яйця
- C** 12% гречану кашу
- D** Овочевий відвар
- E** 5% манну кашу

3

Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

- A** *Геморагічний васкуліт, шкірна форма
- B** Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- C** Кір
- D** Хвороба Верльгофа
- E** Менінгококцемія

4

У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- A** *Природженій ваді серця
- B** Вегето-судинній дистонії
- C** Ревматизмі
- D** Малій хорей
- E** Інфекційному міокардиті

5

У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5x5 см. Симптоми вказують на:

- A** *Рахіт
- B** Гіпервітаміноз Д
- C** Алергічний діатез
- D** Спазмофілію
- E** Гіпотрофію

6

Назвіть об'єктивні симптоми, що характерні для ревматичного артриту:

- A** *Артралгії, що характеризуються симетричністю і летючістю
- B** Стійка деформація дрібних суглобів
- C** Гіперкінези, порушення координації рухів
- D** Клінічні прояви артриту тривало утримуються
- E** М'язова гіпотонія

7

Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантема, плями Філатова-Копліка-Бельського - симптоми, які вказують на:

- A** *Кір
- B** Скарлатину
- C** Менінгококову інфекцію
- D** Вітряну віспу
- E** Краснуху

8

Вкажіть термін закриття великого тім'ячка

- A** *8-18 місяців
- B** 3-6 місяців
- C** 18-24 місяців
- D** 24-26 місяців
- E** 26-28 місяців

9

До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народження 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- A** *5400
- B** 5200
- C** 4800
- D** 5800
- E** 6000

10

Фельдшер ФАПу оглядає дитину 10 років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Кернінга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A** *Менінгококова інфекція
- B** Скарлатина
- C** Кір
- D** Вітряна віспа
- E** Червона висипка

11

Фельдшер ФАПу оглядає дитину з метою оцінки нервово-психічного розвитку. Дитина стежить і повертає голову за рухами яскравого предмету, у напрямку звука, добре утримує голову у вертикальному положенні. Якому віку відповідають дані показники?

- A** *3 місяці
- B** 1 рік
- C** 6 місяців
- D** 1 місяць
- E** 9 місяців

12

Мати дитини 6 місяців скаржиться фельдшеру ФАПу, що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. При об'єктивному обстеженні: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4см, краї його потовщені. На ребрах "чотки", виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

- A** *Рахіт
- B** Екссудативно-катаральний діатез
- C** Гіпотрофія

- D** Диспепсія
- E** Гіпокальціємічний синдром

13

Дитині 3 роки. Мати звернулася до фельдшера зі скаргами на часте дихання, кашель, кволість дитини, підвищення температури тіла до 39°C. При огляді: стан важкий, шкіра бліда, ціаноз носо-губного трикутника. При перкусії вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, при аускультатії - велика кількість кріпуючих хрипів. Про що свідчать дані симптоми?

- A** *Гостра пневмонія
- B** Бронхіальна астма
- C** Гострий бронхіт
- D** Гострий ларинготрахеїт
- E** Хронічна пневмонія

14

Фельдшер здоровпункту оглядає дитину 4-х років. Скарги на підвищення температури тіла 38°C, висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, обличчі, тулубі, поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному випадку:

- A** *21 день
- B** 5 днів
- C** 9 днів
- D** 14 днів
- E** 25 днів

15

Фельдшер здоров пункту оглядає дитину 6 років, що скаржиться на біль при відкриванні рота та жуванні, підвищення температури. При огляді стан середньої важкості, справа в ділянці заушної залози відмічається припухлість, вушна раковина відстовбурчена. При пальпації пухлина помірно болюча, шкіра над нею натягнута. Вкажіть термін ізоляції дитини в даному випадку:

- A** *9 днів
- B** 5 днів
- C** 14 днів
- D** 21 день
- E** 25 днів

16

Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хлопчика 4-х місяців. Скарги матері на підвищення температури тіла до 39°C, неспокій, плач. При огляді: стан хлопчика важкий, шкіра суха, гаряча на дотик, гіперемія кон'юнктив та слизової оболонки зів, утруднене дихання через ніс. Який невідкладний стан виник у дитини?

- A** *Гіпертермічний синдром
- B** Астматичний стан
- C** Судомний синдром
- D** Ларинготрахеїт
- E** Анафілактичний шок

17

Фельдшер прибув на виклик до дитини 10 місяців, яка хворіє ГРВІ. На фоні високої температури тіла раптово з'явилося посіпування м'язів обличчя, потім кінцівок із швидкою генералізацією судом. Для зняття судом необхідно ввести в першу чергу:

- A** *Седуксен
- B** Ефедрин
- C** Спазмалгон

- D** Димедрол
- E** Анальгін

18

Мати скаржиться фельдшеру швидкої допомоги на підвищення температури тіла до 39°C протягом 3 год, неспокій. При огляді: стан важкий, шкіра суха, гаряча на дотик. Дитина в'яла, апатична. Підберіть препарат для надання допомоги на до госпітального етапі:

- A** *Парацетамол
- B** Седуксен
- C** Лазекс
- D** Еуфілін
- E** Адреналін

19

Фельдшер прибув на виклик до дитини 2 років, яка хворіє третій день, має хрипкий голос, "гавкаючий" кашель. Вночі з'явилася задишка, шкіра ціанотична, в акті дихання приймає участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

- A** *Стенозуючий ларинготрахеїт
- B** Ларингоспазм
- C** Напад бронхіальної астми
- D** Стороннє тіло в дихальних шляхах
- E** Ларингіт

20

Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте дитину грудного віку. Під час огляду виявлено: дитина сидить самостійно, добре знає матір. Починає вимовляти склади, у неї прорізуються нижні центральні різці. Якому вікові відповідає психомоторний розвиток дитини?

- A** *6 місяців
- B** 8 місяців
- C** 4 місяці
- D** 9 місяців
- E** 1 рік

21

Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте дитину віком 6 днів після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено набрякання грудних залоз, виділення з них незначної кількості рідини кольору молока. Забарвлення шкіри над залозами не змінене. Який із перехідних станів новонароджених спостерігається у дитини?

- A** *Статева криза
- B** Токсична еритема
- C** Сечокислий інфаркт
- D** Транзиторна гіпертермія
- E** Транзиторний дисбактеріоз

22

Ви - фельдшер ФАП, проводите антропометрію дитині 2-місячного віку, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Якою є належна маса тіла дитини, якщо її маса тіла одразу після народження становила 3200 г?

- A** *4600 г
- B** 5600 г
- C** 3750 г
- D** 5400 г
- E** 4000 г

23

Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте дитину віком 4 днів. Вчора дитина була виписана з пологового стаціонару. Мати повідомила, що близько 2-х годин назад у дитини піднялась температура тіла до 38,5°C. Об'єктивно: дитина неспокійна, відмічається сухість слизових оболонок, гіперемія шкіри. Соматично дитина здорова. Який стан найімовірніше у дитини?

- A** *Транзиторна гіпертермія
- B** Транзиторна гіпотермія
- C** Статева криза
- D** Фізіологічна еритема
- E** Транзиторний катар кишок

24

Вас - фельдшера ФАП, викликали до дитини віком 1 рік, яка хворіє на ГРВІ. Скарги матері на неспокій дитини, сухий нав'язливий "гавкаючий" кашель, осиплість голосу, підвищення температури до 38,5°C. Відмічається інспіраторна задишка, дихання з втягненням податливих місць грудної клітки, роздуванням крил носа. Який з перерахованих препаратів Ви введете дитині?

- A** *Преднізолон
- B** Ампіцилін
- C** Магнію сульфат
- D** Цефотаксим
- E** Контрикал

25

Ви - фельдшер ФАП, проводите патронаж дитини віком 10 днів. Об'єктивно: легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультатії серця вислуховується грубий систолічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини?

- A** *Природжену ваду серця
- B** Спазмофілію
- C** Рахіт
- D** Асфіксію
- E** Бронхіт

26

Вас - фельдшера ФАП, викликали до дитини віком 8 років, яка хворіє на вроджену ваду серця. Стан дитини важкий, відмічається задишка, ціаноз, клекотливе дихання, кашель, виділення пінистого харкотиння. Яке положення потрібно надати цій дитині в ліжку?

- A** *Напівлежаче з підвищеним головним кінцем
- B** Колінно-ліктьове
- C** Горизонтальне з піднятим ножним кінцем
- D** На правому боці з приведеними до живота ногами
- E** Горизонтальне з повернутою набік головою

27

До Вас на ФАП звернулась мати з п'ятирічною дитиною, у якої після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, зміна кольору сечі. Сеча стала каламутною, кольору "м'ясних помий". Об'єктивно: шкірні покриви бліді, пастозні. Відмічається підвищення артеріального тиску. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A** *Гострого гломерулонефриту
- B** Гострої ревматичної гарячки
- C** Інфекційного мононуклеозу
- D** Пієлонефриту
- E** Хронічної ниркової недостатності

28

До Вас на ФАП звернулася мама з дитиною віком 9 років зі скаргами на наявність у дитини періодичних болей в ділянці правого підребер'я, які супроводжуються нудотою. Об'єктивно: при пальпації живіт м'який, болючий в точці проекції жовчного міхура, печінка не збільшена. Яке обстеження необхідно зробити для уточнення діагнозу?

- A** *УЗД органів черевної порожнини
- B** Обзорну рентгенографію живота
- C** Рентгенографію органів грудної клітки, загальний аналіз крові
- D** УЗД нирок, загальний аналіз сечі
- E** УЗД серця, ЕКГ

29

Вас - фельдшера ФАПу, викликали до дитини віком 14 років. Скарги на блювання і чорні рідкі випорожнення. В анамнезі у дитини - виразкова хвороба 12-палої кишки. Які заходи невідкладної допомоги Ви повинні виконати?

- A** *Покласти міхур з льодом на живіт, ввести кровоспинні препарати
- B** Промити шлунок розчином перманганату калію
- C** Зробити очисну клізму
- D** Ввести внутрішньовенно розчин глюкози
- E** Промити шлунок холодною водою

30

До Вас на ФАП звернулася мама з дитиною віком 12 років. Дитина скаржиться на виражений біль у верхньому відділі живота, який виникає після споживання їжі, відрижку кислим, печію. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, при пальпації живіт м'який, болючий в епігастральній ділянці. Печінка не збільшена. Яке додаткове дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

- A** *Фіброгастродуоденоскопія
- B** Холецистографія
- C** УЗД печінки і жовчного міхура
- D** Колоноскопія
- E** УЗД нирок

31

Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипу?

- A** *1-2% спиртовим розчином діамантового зеленого
- B** 3% розчином перекису водню
- C** Дитячим кремом
- D** Перевареною водою
- E** Елементи висипу не обробляти

32

Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте трьохмісячну дитину. Дитина млява, сонлива, відмічається пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці - 52 см. Яку патологію Ви запідозрите?

- A** *Вроджений гіпотиреоз
- B** Лімфатико-гіпопластичний діатез
- C** Рахіт
- D** Гіпертиреоз
- E** Хвороба Дауна

33

До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною хворою на гострий пієлонефрит. Які

зміни характерні для даного захворювання?

- A** *Піурія
- B** Петехіальний висип на шкірі
- C** Глюкозурія
- D** Ціаноз шкіри
- E** Макрогематурія

34

До фельдшера ФАПу звернулася мати дворічної дитини, у якої гостро розвинувся набряк по всьому тулубу. Артеріальний тиск - 120/80 мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі - 4,5 г/л, мікрогематурія. Для якого захворювання характерні такі проблеми?

- A** *Гострий гломерулонефрит
- B** Гострий панкреатит
- C** Гострий пієлонефрит
- D** Ізольований сечовий синдром
- E** Хронічна ниркова недостатність

35

У дитини 10 років фельдшер ФАПу запідозрив ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені додаткові методи обстеження. Який показник підтвердить даний діагноз?

- A** *Поява С-реактивного протеїну
- B** Збільшення холестерину крові
- C** Гіперглікемія
- D** Гіпоглікемія
- E** Підвищення рівня білірубіну в крові

36

Дитині, що народилася на 35 тижні вагітності з масою тіла 2000 г, фельдшер ФАПу почне специфічну профілактику рахіту з:

- A** *2 тижневого віку
- B** 1 місячного віку
- C** 1,5 місячного віку
- D** 2 місячного віку
- E** 3 місячного віку

37

Під час огляду новонародженого мати поскаржилася на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер ФАПу помітив різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться в "Памперсах", шкірні складки оброблюються присипками час від часу. Про яке захворювання треба подумати?

- A** *Попрілість
- B** Пітниця
- C** Піодермія
- D** Фізіологічна еритема
- E** Токсична еритема

38

Після проведення туберкулінодіагностики дитині п'яти років фельдшером ФАПу була виявлена вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?

- A** *Віражу туберкулінових проб
- B** Вродженій ваді серця
- C** Пневмонії
- D** Бронхіальній астмі
- E** Ревматичній хворобі

39

Мати дитини 5 р. звернулась до фельдшера ФАПУ зі скаргами на плями, дрібні папули різної величини та везикули, які розташовані на шиї, обличчі, волосистій частині голови. Дитина млява, дратівлива, $t^{\circ} - 37,7^{\circ}C$. Для якого захворювання характерні вище названі симптоми?

- A** *Вітряної віспи
- B** Кору
- C** Скарлатини
- D** Краснухи
- E** Менінгококкової інфекції

40

До фельдшера ФАПУ звернулась мати з дитиною 10 років зі скаргами на збільшення задньошийних, потиличних лімфатичних вузлів, дрібно-плямистий висип на шкірі при субфебрильній температурі тіла. Якому захворюванню властиві ці симптоми?

- A** *Краснусі
- B** Кору
- C** Вітряній віспі
- D** Скарлатині
- E** Алергічному дерматиту

41

У дитини клінічні ознаки дискінезії жовчних шляхів. З якими скаргами дитина звернулась до фельдшера ФАПУ?

- A** *Раптовим, переймоподібним болем у правому підреб'ї
- B** Стійким болем у надчеревній ділянці
- C** Пекучим болем у лівому підреб'ї
- D** Болем у надлобковій ділянці
- E** Болем у поперековій ділянці

42

Мати дитини 12 років звернулась до фельдшера ФАПУ з приводу загострення виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики необхідно призначити дитині?

- A** *Фіброгастроуденоскопію
- B** Рентгенографію шлунку
- C** Ректороманоскопію
- D** Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
- E** Дуоденальне зондування

43

Фельдшер ФАПУ при обстеженні дитини 15 років виявив ознаки холециститу. Назвіть необхідні методи дослідження для підтвердження діагнозу:

- A** *Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- B** рН-метрія
- C** Фіброгастроуденоскопія
- D** Ректороманоскопія
- E** Шлункове зондування

44

При огляді новонародженої дитини на 4 добу фельдшер ФАПУ виявив зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?

- A** *Фізіологічною втратою маси тіла
- B** Статевою кризою новонародженого
- C** Сечокислим інфарктом нирок
- D** Транзиторним дисбактеріозом
- E** Фізіологічною еритемою

45

При огляді дитини 12 місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. Які зміни повинні бути у місці щеплення?

- A** *Рубчик
- B** Інфільтрат
- C** Пустула
- D** Виразка
- E** Везикула

46

При патронажі здорової доношеної дитини віком 4 доби фельдшер ФАПу помітив жовтяничне забарвлення шкіри. Дитина активна, загальний стан не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?

- A** *Фізіологічною жовтяницею
- B** Фізіологічною еритемою
- C** Статевою кризою новонародженого
- D** Транзиторним дисбактеріозом
- E** Транзиторною лихоманкою

47

До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання "фонтаном" без домішок жовчі, має кислий запах. Дитина погано прибавляє в масі тіла. При огляді живота з'являється симптом "пісового годинника". Визначіть попередній діагноз у дитини:

- A** *Пілоростеноз
- B** Пілороспазм
- C** Диспепсія
- D** Гострий гастрит
- E** Виразкова хвороба

48

Оцінка фізичного розвитку дітей шляхом складання графіків "Довжина тіла/зріст/вік" проводиться за наказом МОЗу:

- A** *№149
- B** №152
- C** №720
- D** №120
- E** №437

49

Мати дитини 5 років звернулася до фельдшера зі скаргами на те, що в дитини підвищилася температур тіла до 38°C, з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю - блювання. Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи в склеру очей. Яку хворобу можна запідозрити:

- A** *Кашлюк
- B** Пневмонія
- C** Стенозуючий ларинготрахеїт
- D** Обструктивний бронхіт
- E** Бронхіальна астма

50

В пологовому будинку всім здоровим новонародженим дітям проводять щеплення:

- A** *Проти туберкульозу та гепатиту В
- B** Проти кору

- C* Проти гемофільної інфекції
- D* Проти дифтерії
- E* Проти епіпаротиту

51

Дитина народилася передчасно з вагою 1700 г, від першої ускладненої вагітності. Профілактику якого захворювання слід передбачити при складанні плану догляду за недоношеною дитиною?

- A* *Анемії
- B* Алергічного діатезу
- C* Гострих розладів травлення
- D* Гемолітичної хвороби
- E* Спазмофілії

52

Дитині 5р. поставлено діагноз - дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредко. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?

- A* *Внутрішньошкірно
- B* Підшкірно
- C* Внутрішньом'язово
- D* Внутрішньовенно
- E* Інгаляційно

53

Дитина 3 місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

- A* *Недогодовування
- B* Перегодовування
- C* Кишковий токсикоз
- D* Просту диспепсію
- E* Парентеральну диспепсію

54

Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів фельдшер виявив, що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Про яке захворювання можна подумати?

- A* *Катаральний омфаліт
- B* Гнійний омфаліт
- C* Некротичний омфаліт
- D* Сепсис новонароджених
- E* Пупкову килу

55

Дітям у школі проведена проба Манту. Через який проміжок часу необхідно оцінити її результати у дітей?

- A* *72 год.
- B* 12 год.
- C* 24 год.
- D* 48 год.
- E* 56 год.

56

У дівчинки 7-ми років скарги на періодичний ниючий біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання. В сечі: лейкоцити - 16 в полі зору. Яку патологію можна запідозрити в даному випадку?

- A* *Інфекцію сечовивідних шляхів

- B** Гострий вагініт
- C** Гострий гломерулонефрит
- D** Гострий проктит
- E** Енурез

57

У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна нестійкість. Об'єктивно: хлопчик пониженого харчування, астеничної тілобудови. інтелектуально добре розвинутий, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації.

В сечі - сечокислі солі (урати) +++ . Ця клінічна картина характерна для діабезу:

- A** *Нервово-артритичного
- B** Атопічного
- C** Ексудативно-катарального
- D** Алергічного
- E** Лімфатико-гіпопластичного

58

Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження апетиту, втомлюваність. В аналізі крові: Нb- 90 г/л, ер.- $3,2 \cdot 10^{12}/л$, ЦП- 0,8. Призначення яких ліків найбільш раціональне?

- A** *Препаратів заліза
- B** Вітаміну А
- C** Вітаміну Д
- D** Глюконату кальцію
- E** Алохолу

59

При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?

- A** *Кефалогематома
- B** Септикопемія
- C** Пологова пухлина
- D** Пухирчатка новонародженого
- E** Внутрішньочерепна травма

60

У дитини 2-х місяців у паховій ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** *Попрілості III ступеня
- B** Везикулопустульоз
- C** Пітниця
- D** Попрілості I ступеня
- E** Пухирчатка новонародженого

61

Дитині виповнилося 5 років. Ви повинні запросити матір з дитиною на ревакцинацію проти кору, паротиту, краснухи. В якому віці робиться це щеплення?

- A** *6 років
- B** 7 років
- C** 14 років
- D** 15 років
- E** 18 років

62

На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях. Для якого захворювання це характерно?

- A** *Скарлатини

- B** Кору
- C** Вітряної віспи
- D** Червоної висипки
- E** Менінгококової інфекції

63

Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-інфекції. Які випорожнення характерні для даного захворювання?

- A** *Водянисті оранжевого кольору
- B** Пінисті темно-зеленого кольору
- C** У вигляді "січеного яйця"
- D** Кров'янисто-слизові
- E** У вигляді рисового відвару

64

У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт, з'явилося посмикування м'язів обличчя з залученням інших груп м'язів. Про яке захворювання можна думати:

- A** *Явну спазмофілію, еклампсію
- B** Явну спазмофілію, ларингоспазм
- C** Явну спазмофілію, карпопедальний спазм
- D** Приховану спазмофілію, симптом Хвостека
- E** Приховану спазмофілію, симптом Маслоу

65

Ви проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації матері щодо грудного вигодовування. Що з перерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?

- A** *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини
- B** Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди
- C** Новонароджених годують 5 разів на добу
- D** Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]
- E** Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

66

До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, нападopodobний настирливий кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно - емфізематозне здуття грудної клітки; аускультативно - різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Ви запідозрили бронхіальну астму. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?

- A** *Спірометрія
- B** Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки
- C** Загальний аналіз крові
- D** Бронхоскопія
- E** Загальний клінічний аналіз мокротиння

67

Яке профілактичне щеплення потрібно провести дитині в один місяць?

- A** *Проти гепатиту В
- B** Проти кору, краснухи, паротиту
- C** БЦЖ
- D** АКДП
- E** Проти гемофільної інфекції

68

Ви оглядаєте дитину, що хворіє на цукровий діабет та отримує інсулін. Поясніть матері, яке ускладнення найчастіше виникає в разі порушення дієти?

- A** *Гіперглікемічна кома

- B** Геморагічний синдром
- C** Гостра ниркова недостатність
- D** Гіпертермічний синдром
- E** Недостатність надниркових залоз

69

У дитини 8 днів шкіра землистого кольору, дихання слабке, поверхневе, тахікардія, збільшена печінка, селезінка. У дитини кровоточить пупок, спостерігається зригування, нестійкі рідкі випорожнення. Про яке захворювання слід думати:

- A** *Сепсис новонародженого
- B** Пневмонію
- C** Геморагічний омфаліт
- D** Гепатит
- E** Внутрішньо- черепну пологову травму

70

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас звернувся хлопчик 12 років, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5°C, набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. З якого дослідження треба розпочати обстеження дитини?

- A** *Загального аналізу сечі
- B** Проби за Зимницьким
- C** Аналізу сечі на бактеріурію
- D** Проби за Нечипоренко
- E** Проби за Амбурже

71

Ви берете мазок на менінгокок у дитини 10 років. Які особливості проведення процедури?

- A** *Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на стержні, зігнутому під кутом 45°
- B** Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на прямому стержні
- C** Мазок беруть з мигдаликів на межі здорової та ураженої тканини
- D** Мазок беруть після полоскання антисептичними розчинами
- E** Мазок беруть з носоглотки після їжі

72

Після проведення первинного патронажу до новонародженого відомості про дитину слід записати у форму:

- A** *№ 112/О
- B** № 026/О
- C** № 063/О
- D** № 058/О
- E** № 067/О

73

У дитини з гемофілією А почалася носова кровотеча. Який препарат використовується для припинення кровотечі?

- A** *Кріопреципітат
- B** Діцинон
- C** Вікасол
- D** Хлористий кальцій
- E** Вітамін С

74

У 5-місячної дитини з явищами рахіту, під час крику наступила раптова зупинка дихання. Про яке захворювання свідчить цей симптом?

- A** *Спазмофілію, ларингоспазм

- B** Стенозуючий ларинготрахеїт
- C** Спазмофілію, карпопедальний спазм
- D** Спазмофілію, еклампсію
- E** Гіпервітаміноз Д

75

У 5-річного хлопчика розвинувся анафілактичний шок на введення антибіотика. Яким препаратом потрібно обколоти місце введення алергена?

- A** *0,1% р-ном адреналіну гідрохлориду
- B** 50% р-ном анальгін
- C** 0,5% р-ном новокаїну
- D** 10% р-ном глюконату кальція
- E** 15% р-ном дімедролу

76

Під час госпіталізації дитини з менінгококовою інфекцією у неї почалися судоми. Який препарат слід ввести?

- A** *Седуксен 0,05%
- B** Димедрол 1%
- C** 10% р-н глюконату кальція
- D** 0,9% р-н хлориду натрія
- E** 40% р-н глюкози

77

З якого препарату слід розпочати невідкладну допомогу у випадку нападу бронхіальної астми?

- A** *Беротеку
- B** Теофліну
- C** Анаприліну
- D** Папаверину
- E** Хлористого кальція

78

Які можливі негативні наслідки відсмоктування слизу з ротової порожнини та носоглотки у новонародженої дитини?

- A** *Розвиток аритмії та брадикардії
- B** Тахікардія
- C** Гіпертермія
- D** Експіраторна задишка
- E** Негативних наслідків не має

79

Які клінічні прояви характерні для катарального періоду кору?

- A** *Плями Бельського-Філатова-Копліка
- B** Поетапна висипка
- C** Пігментація
- D** Геморагічні висипання на шкірі
- E** Пластинчасте лущення

80

При огляді дитини 5 років ви виявили погіршення стану, підвищення температури тіла, набряк у ділянці привушної слинної залози праворуч, відмову від їжі. Про яке захворювання слід думати?

- A** *Паротитну інфекцію
- B** Краснуху
- C** Скарлатину
- D** Кір

E Вітряну віспу

81

Під час проведення первинного патронажу до новонародженого, мати поцікавилась чи треба поїти дитину кип'яченою водою і в якій кількості? Дитина здорова, молока у матері достатньо. Яку рекомендацію повинен дати фельдшер?

- A** *Нічого, крім грудного молока не давати
- B** Давати воду до 200 мл на добу
- C** Давати воду до 120 мл на добу
- D** Давати воду до 5 мл на добу
- E** Поїти водою кожні 2 години по 20 мл

82

Яку дозу вітаміну Д3 слід призначити дитині з ознаками рахіту І ст. важкості?

- A** *2000 ОД на добу
- B** 4000 ОД на добу
- C** 3000 ОД на добу
- D** 5000 ОД на добу
- E** 1000 ОД на добу

83

У флаконі 1,0 г. цефтриаксону. Його розвели 5 мл ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- A** *1,5 мл
- B** 2 мл
- C** 3 мл
- D** 4 мл
- E** 5 мл

84

У крові дитини відзначається наявність незрілих бластних клітин, стан важкий, шкіра бліда, крововиливи, збільшені печінка та селезінка. Визначте попередній діагноз:

- A** *Лейкоз
- B** Анемія
- C** Тромбоцитопенічна перпура
- D** Гемофілія
- E** Геморагічний васкуліт

85

Наявність чистого носогубного трикутника на тлі дрібноточкового висипу на фоні гіперемованої шкіри при скарлатині носить назву:

- A** *Симптом Філатова
- B** Симптом Керніга
- C** Симптом Копліка-Філатова-Бельського
- D** Симптом Хвостека
- E** Симптом Брудзинського

86

Який головний чинник виникнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки?

- A** **Helicobacter pylori*
- B** Кишкова паличка
- C** Стафілокок
- D** Стрептокок
- E** Протей

87

Дитина 2міс., народилась у грудні, з масою тіла 3100 г, перебуває на природному вигодовуванні. Зараз маса тіла становить 4500 г, нервово-психічний розвиток відповідає віку. Патології внутрішніх органів немає. Яку профілактику рахіту слід призначити цій дитині?

- A** *Вітамін Д по 500 МО щоденно
- B** Вітамін Д по 200 МО на добу
- C** Аскорбінова кислота по 30 мг з рази на добу
- D** Жовток курячого яйця
- E** Кальцію глюконат по 400-500 мг на добу

88

В якому віці вводиться перший прикорм здоровій дитині?

- A** *6 місяців
- B** 3 місяці
- C** 1 рік
- D** 9 місяців
- E** 4 місяці

89

Ви фельдшер ФАПУ. До вас звернулась мама 6-річної дитини зі скаргами на поганий апетит, схуднення, тривалий субфебрилітет. Об'єктивно: шкіра бліда, збільшені всі групи лімфатичних вузлів, проба Манту - папула 14 мм. Поставте попередній діагноз:

- A** *Туберкульоз невстановленої локалізації
- B** Бронхіальна астма
- C** Хронічна пневмонія
- D** Залізодефіцитна анемія
- E** Гострий лейкоз

90

Дитина, 7 років, скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, задишку, малопродуктивний кашель. Хворіє протягом тижня. Об'єктивно: температура тіла 39,5°C, відзначається задишка змішаного типу, вкорочення перкуторного звуку, жорстке дихання, крепітуючі хрипи. Який найвірогідніший діагноз?

- A** *Пневмонія
- B** Бронхіт обструктивний
- C** Бронхіт простий
- D** Туберкульоз легень
- E** Бронхіальна астма

91

Дитина від доношеної вагітності народилась з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження з'явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін - 100 мкмоль/л. Група крові матері В (III) Rh (-), дитини - 0 (I) Rh (+). Який діагноз у цьому випадку найбільш ймовірний?

- A** *Гемолітична хвороба новонароджених
- B** Фізіологічна жовтяниця
- C** Вроджений гепатит
- D** Атрезія жовчовивідних шляхів
- E** Сепсис новонароджених

92

Хлопчик, 13 років, звернувся до фельдшера зі скаргами на сухий кашель, задишку. Хворіє протягом 1 року. Напади задишки короткочасні, 1-2 рази на місяць. Об'єктивно: неспокій, блідість шкіри, періоральний ціаноз, експіраторна задишка, частота дихальних рухів - 48/хв. Над легеньми вислуховується перкуторний звук з коробковим відтінком. Аускультативно - послаблене дихання, сухі свистячі хрипи з обох боків. Який із

препаратів найдоцільніше призначити хворому?

- A** *Сальбутамол
- B** Діазолін
- C** Супрастин
- D** Еуфілін
- E** Амброксол

93

Дитина, 7 років, захворіла гостро. З'явився біль у животі, попереку, підвищилась температура тіла до 39°C. Під час огляду: позитивний симптом Пастернацького з обох боків. В аналізі сечі: лейкоцити вкривають все поле зору. Яке захворювання є найбільш імовірним?

- A** *Гострий пієлонефрит
- B** Гострий гломерулонефрит
- C** Грип
- D** Гострий цистит
- E** Сечокам'яна хвороба

94

Хлопчик, 7 років, скаржиться на часті сечовипускання, у тому числі вночі, спрагу та вживання великої кількості рідини, схуднення, загальну слабкість. Хворіє протягом 2 тижнів. Під час об'єктивного обстеження виявлено виражену сухість шкіри та слизових оболонок, зниження тургору шкіри. Встановлено, що батько дитини з 18-річного віку хворіє на цукровий діабет I типу. Які першочергові лабораторні дослідження необхідно призначити для встановлення діагнозу?

- A** *Рівень глікемії натще
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Аналіз сечі за Земницьким
- E** Аналіз сечі за Нечипоренко

95

Хлопчик, 6 років, 2 тижні тому перехворів ангіною. Під час звертання скаржиться на головний біль, набряки під очима, червону сечу. В аналізі сечі: білок - 1,23 г/л, еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити 10-15 у полі зору, гіалінові циліндри - 5-6. Який Ваш попередній діагноз?

- A** *Гострий гломерулонефрит
- B** Гострий пієлонефрит
- C** Хронічний пієлонефрит
- D** Цистит
- E** Геморагічний васкуліт, нирковий синдром

96

Дитина, 9 міс. При об'єктивному обстеженні шкіра бліда, суха, вяла. Тургор тканин значно знижений. М'язова гіпотонія. Підшкірно-жирова клітковина на животі і кінцівках відсутня. Дефіцит ваги - 25%. Поставте попередній діагноз:

- A** *Гіпотрофія II ступеню
- B** Гіпотрофія I ступеню
- C** Гіпотрофія III ступеню
- D** Паратрофія
- E** Нормотрофія

97

З якого віку і яку страву можна рекомендувати в якості I прикорму?

- A** *3 6 місяців овочево пюре
- B** 3 4 місяців фруктове пюре
- C** 3 4 місяців молочну кашу

- D** 3 6 місяців яблучний сік
- E** 3 5 місяців кефір

98

У дитини 7 днів життя мати помітила кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини та нагубання молочних залоз. З чим це пов'язано?

- A** *Статевою кризою
- B** Реакцією на грудне молоко
- C** Впливом зовнішніх чинників
- D** Запальними захворюваннями шкіри
- E** Сепсисом

99

Етіологічним чинником захворювання, яке розвивається у новонароджених і грудних дітей і називається пліснявкою, є:

- A** **Candida albicans*
- B** Стафілокок
- C** Стрептококк
- D** Вірус звичайного герпесу
- E** Вірус вітряної віспи

100

Який із перерахованих лікарських препаратів має антигельмінтну дію?

- A** *Ворміл
- B** Персен
- C** Гемофер
- D** Фестал
- E** Піпольфен

101

Для якого захворювання характерні перераховані симптоми: поліурія, полідипсія, поліфагія, втрата маси тіла?

- A** *Цукрового діабету
- B** Гломерулонефриту
- C** Пієлонефриту
- D** Анемії
- E** Лейкозу

102

На прийом до фельдшера ФАПУ прийшла мати з дитиною 8 років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль при ковтанні. При огляді виявлено гіперемію і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені, вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Ваш орієнтовний діагноз?

- A** *Дифтерія
- B** Епідемічний паротит
- C** Стоматит
- D** Ангіна
- E** Скарлатина

103

Дітям перед ревакцинацією БЦЖ проведена проба Манту. Отримано такі результати: у 8 дітей - негативна проба, у 4 дітей - сумнівна проба, у 7 дітей - позитивна проба. Скільки дітей підлягають ревакцинації?

- A** *8
- B** 4

- C** 7
- D** 12
- E** 19

104

Фельдшер запідозрив латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для данного захворювання?

- A** *Хвостека
- B** Керніга
- C** Брудзинського
- D** Ортнера
- E** Кера

105

На прийомі у фельдшера ФАПу мати 2-х місячної дитини запитала: “Яка прибавка маси тіла у цьому віці вважається нормою?”

- A** *800 г
- B** 500 г
- C** 600 г
- D** 750 г
- E** 700 г

106

Ви працюєте фельдшером ФАПу. У дитини 3 місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,0 x 3,5 см., краї пом'якшені. Дані симптоми вказують на:

- A** *Рахіт
- B** Гіпервітаміноз Д
- C** Спазмофілію
- D** Нервово-артритичний діатез
- E** Ексудативно-катаральний діатез

107

Ви працюєте фельдшером в школі. У дитини 7 років t° - 38°C , біль в горлі, дрібно-точковий висип, блідий носо-губний трикутник, “малиновий язик”. Вкажіть термін ізоляції хворого:

- A** *22 дні
- B** 17 днів
- C** 9 днів
- D** 5 днів
- E** 25 днів

108

У 10-річної дівчинки діагностовано ревматизм. Назвіть основні великі діагностичні критерії (Кіселя-Джонса-Нестерова) даного захворювання:

- A** *Кардит, поліартрит, мала хорея, ревматичні вузлики, анулярна еритема
- B** Кардит, артралгії, мала хорея
- C** Артрит, ревматичні вузлики, висока температура тіла
- D** Кардит, поліартрит, зміни на ЕКГ
- E** Лейкоцитоз, підвищена ШОЕ, артрит

109

Ви працюєте фельдшером ФАПу. Визначте профілактичну добову дозу вітаміну Д для здорової доношеної дитини:

- A** *500 ОД
- B** 200 ОД
- C** 800 ОД

- D** 1000 ОД
- E** 1600 ОД

110

Ви фельдшер ФАПУ. Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці, що виникає натще, може бути нічним або через 2 години після їжі:

- A** *Виразкової хвороби
- B** Гострого гастриту
- C** Гострого панкреатиту
- D** Холециститу
- E** Хронічного коліту

111

Ви фельдшер ФАПУ проводите бесіду з матір'ю новонародженої дитини. Яка нормальна температура у новонародженої дитини?

- A** *36,5-37,5°C
- B** 36,1-36,4°C
- C** 30,0-32,0°C
- D** 33,0-35,0°C
- E** 32,2-34,5°C

112

Ви фельдшер ФАПУ. Відбулися пологи вдома Після народження дитини спостерігають жовтяничне забарвлення навколишньоплодних вод і пупкового канатика, жовтяниця у дитини швидко наростає. У матері резус-фактор (-), у дитини (+). Який попередній діагноз можна поставити?

- A** *Жовтянична форма ГХН
- B** Анемічна форма ГХН
- C** набрякова форма ГХН
- D** Сепсис новонароджених
- E** Асфіксія новонароджених

113

Фельдшер оглянув новонароджену дитину після пологів вдома. При огляді новонародженої дитини на першій хвилині життя ЧСС становить менше 100/хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлекс слабкі, тонус м'язів знижений. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?

- A** *Асфіксія новонароджених
- B** Колапс
- C** Пологова травма
- D** Гемолітична хвороба новонароджених
- E** Пневмонія

114

Виклик фельдшера до дитини 12-ти років. Після ін'єкції інсуліну у дванадцятирічної дитини змінився стан. Шкіра стала блідою, вкрилась холодним липким потом. Раптово почалися судоми. Надайте невідкладну допомогу:

- A** *Ввести 20% розчин глюкози внутрішньовенно струминно до виходу з коми
- B** Ввести інсулін 0,1-0,2 ОД на 1кг маси тіла струминно внутрішньовенно
- C** Ввести ізотонічний розчин натрію хлориду 10 мл на 1 кг маси краплинно
- D** Ввести краплинно 4% розчин бікарбонату натрію 10 мл на 1 кг маси
- E** Ввести реополіглюкін 10 мл на 1 кг маси крапельно

115

Виклик фельдшера до дитини 2-х років . Скарги на появу судом. Надайте допомогу:

- A** *Ввести 0,5% розчин седуксену 0,5 мг на 1 кг маси тіла

- B** Ввести 50% розчин аналгіну 0,1 мл на 1 рік життя
- C** Ввести 40% розчин глюкози 5 мл на 1 кг маси тіла
- D** Ввести 1% розчин дімедролу 1 мг на 1 кг маси тіла
- E** Ввести розчин преднізолону 1 мг на 1 кг маси тіла

116

Під час проведення фельдшером профілактичного щеплення проти дифтерії, коклюшу, правця у дитини запаморочилася голова, з'явилася тиснення за грудиною, шкіра вкрилася холодним потом. Яким препаратом треба обколоти місце введення вакцини?

- A** *0,1% розчин адреналіну
- B** 50% розчин аналгіну
- C** Розчин преднізолону
- D** 1% розчин дімедролу
- E** 20% розчин оксібутірату натрію

117

На ФАП для профілактичного огляду принесли дитину 1 року життя. Профілактичні щеплення проводились згідно календарного плану. Дитина здорова. Вкажіть, що необхідно призначити?

- A** *Пробу Манту
- B** Ревакцинацію проти дифтерії
- C** Вакцинацію проти кору
- D** Ревакцинацію проти поліомієліту
- E** Вакцинацію проти епідпаротиту

118

Фельдшер у дитини 3-х місячного віку виявив такі симптоми: підвищену пітливість, облісіння потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?

- A** *Початковий
- B** Розпалу
- C** Залишкових явищ
- D** Реконвалесценції
- E** Термінального

119

На профілактичному огляді ви вимірюєте тиск 5 річній дитині. За якими формулами ви визначите систолічний та діастолічний тиск:

- A** * $90+2n$ $60+n$
- B** $70+2n$ $50+n$
- C** $100+2n$ $80+n$
- D** $60+2n$ $40+n$
- E** $90+2n$ $50+n$

120

Яке співвідношення між білками, жирами, вуглеводами у добовому раціоні дитини I півріччя життя на природному вигодовуванні:

- A** *1:3:6
- B** 1:2,5:4
- C** 1:1:4
- D** 2:6:9
- E** 3:1:6

121

Фельдшер прийшов на виклик до дитини 5 днів. Мати стурбована появою на пелюшці червонуватого забарвлення від сечі. Загальний стан дитини не порушений. Чим це пояснюється?

- A** *Наявністю сечокислого інфаркту нирок
- B** Наявністю статевої кризи
- C** Наявністю захворювання нирок
- D** Наявністю транзиторної лихоманки
- E** Наявністю дизбактеріозу

122

У дитини, хворої на парагрип, з'явилися "гавкаючий кашель", захриплість голосу, ціаноз носо-губного трикутника. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A** *Стенозуючий ларингіт
- B** Бронхіт
- C** Пневмонія
- D** Риніт
- E** Фарингіт

123

Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:

- A** *Потиличними та тім'яними
- B** Лобними та тім'яними
- C** Лобними
- D** Скроневими та тім'яними
- E** Лобними та скроневими

124

Дитині 10 днів. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

- A** *Слабкість кардіального сфінктера шлунка
- B** Підвищена секреторна активність шлунка
- C** Знижена секреторна активність шлунка
- D** Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка
- E** Підвищена перистальтика шлунка

125

Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?

- A** *Протягом першої години після народження
- B** Через 2,5 год.
- C** Через 1,5 год.
- D** Через 3 год.
- E** Через 3,5 год.

126

Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?

- A** * З 6 місяців, овочеve пюре
- B** З 5 місяців, сік фруктовий
- C** З 4 місяців, овочеve пюре
- D** З 6-ти місяців, кефір
- E** З 6-ти місяців, 20% манна каша

127

Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорм введений своєчасно. Мати запитує: "До якого віку бажано годувати груддю?"

- A** *До 2-х років
- B** До 1 року
- C** До 9 місяців

- D* До 6 місяців
- E* До 7 місяців

128

Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання можна виявити під час обстеження?

- A* *Експіраторну задишку
- B* Брадіпноє
- C* Тахіпноє
- D* Інспіраторну задишку
- E* Апноє

129

Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?

- A* *З додаванням морської солі
- B* З додаванням відвару ромашки
- C* З додаванням відвару дубової кори
- D* З додаванням крохмалю
- E* З додаванням відвару череди

130

Дитина 6 років хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при кору:

- A* *Пневмонія
- B* Ураження печінки
- C* Ангіна
- D* Міокардит
- E* Орхіт

131

Вкажіть максимальний інкубаційний період при краснусі:

- A* *23 дні
- B* 14 днів
- C* 7 днів
- D* 5 днів
- E* 2 дні

132

Назвіть термін проведення II ревакцинації поліомієлітною вакциною:

- A* *6 років
- B* 18 місяців
- C* 8 місяців
- D* 2 роки
- E* 14 років

133

При обстеженні дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, температура - 38,6°C. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик малиновий, сосочки гіпертрофовані. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів:

- A* *Пластинчасте лущення
- B* Везикули
- C* Плями
- D* Висип
- E* Пігментація

134

Який характерний симптом спостерігають на 3 день висипання у разі захворювання на вітряну віспу?

- A** *Поліморфізм висипу
- B** Плями Бельського-Філатова-Коплека
- C** Симптом Філатова
- D** Палаючий зів
- E** Афонія голосу

135

Дитині 14 років, хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

- A** *Орхіт
- B** Гострий пієлонефрит
- C** Гострий цистит
- D** Гостра затримка сечі
- E** Гідронефроз

136

У новонародженої діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання поширенню інфекції після госпіталізації?

- A** *Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу
- B** Карантин на 21 день
- C** Ізолювати дитину не потрібно
- D** Провести щеплення проти пухирчатки
- E** Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів

137

На игровой площадке, ребенку 10 лет, ударили мячом в лицо, началось носовое кровотечение. Вы фельдшер ФАПа, окажите неотложную помощь ребенку:

- A** *Усадить, немного наклонить голову вперед и придавить крыло носа к носовой перегородке
- B** Уложить с приподнятым головным концом
- C** Уложить запрокинув голову назад
- D** Ввести тампон с холодной водой в нос
- E** Усадить, запрокинув голову назад

138

Ребенку необходимо провести первую ревакцинацию АКДС. В какие сроки фельдшер должен провести первую ревакцинацию АКДС?

- A** *18 месяцев
- B** 12 месяцев
- C** 10 месяцев
- D** 8 месяцев
- E** 6 месяцев

139

Фельдшер проводит ребенку профилактическую прививку против кори, краснухи и эпидемического паротита. Назовите сроки первой вакцинации:

- A** *12 месяцев
- B** 4 месяца
- C** 3 месяца
- D** 2 месяца
- E** 1 месяц

140

Ребенок наблюдается на ФАПе по поводу острого рахита. Получает лечение. За какими показателями крови необходимо наблюдать в динамике?

- A** *Ca⁺⁺; P⁺ (кальций, фосфор)
- B** Белок, гематокрит
- C** Эритроциты, тромбоциты
- D** АЛТ, АСТ
- E** Креатинин, мочеви́на

141

Фельдшер СМП вызван к ребенку 10-ти лет. Жалобы на боль в области сердца, утомляемость, раздражительность. Две недели тому перенёс обострение хронического тонзиллита. При осмотре бледен отмечается тахикардия, тоны приглушены, границы относительной сердечной тупости - расширены влево, АД- 100/60 мм рт.ст. Какое заболевание должен заподозрить фельдшер?

- A** *Ревмокардит
- B** Анемию
- C** Порок сердца
- D** Вегетососудистую дистонию
- E** Сепсис

142

На приёме ребёнок 4-х лет Необходимо рассчитать долженствующую массу. Какую формулу вы будете использовать?

- A** *10+2п
- B** 80+п
- C** 80+2п
- D** 75+2п
- E** п-4

143

До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 10 місяців з діагнозом: "рахіт, період розпалу, гострий перебіг", якій педіатр призначив вітамін Д. Мати запитує, як довго потрібно давати лікувальну дозу вітаміну Д:

- A** *Протягом 35-40 діб
- B** Протягом 40-60 діб
- C** Протягом 5-10 діб
- D** Протягом 10-14 діб
- E** Протягом 2-5 діб

144

Фельдшер ФАПу аналізує загальний аналіз крові дитини із залізодефіцитною анемією. Який з показників крові вказує на розвиток тільки такого виду анемії:

- A** *Гіпохромія еритроцитів
- B** Зниження гемоглобіну
- C** Підвищення кольорового показника
- D** Зміна розміру і форми еритроцитів
- E** Збільшення ШОЕ

145

Фельдшер ФАПу наглядає дитину першого місяця життя. При плановому огляді потрібно визначити середнє значення приросту маси тіла дитини на першому місяці життя:

- A** *600 г
- B** 1500 г
- C** 1000 г
- D** 250 г

146

Фельдшер ФАПу оглядає дитину 3 місяців, яка вчасно не була щеплена вакциною БЦЖ за наявними протипоказаннями. На даний час дівчинка здорова. Визначитесь з необхідністю щеплення дитини:

- A** *Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і негативної проби Манту
- B** негайно провести щеплення після ретельного обстеження дитини
- C** Провести щеплення після наступної планової вакцинації за календарем
- D** Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і позитивної проби Манту
- E** Відкласти щеплення до виповнення дитині 7 років

147

Яку формулу використає фельдшер ФАПу для розрахунку зросту дитини до 4 років при оцінці її фізичного розвитку (п - вік дитини)?

- A** * $100-8x(4-p)$
- B** $70xp$
- C** $80xp$
- D** $100+6x(p-4)$
- E** $10+2xp$

148

Фельдшер ФАПу доглядає дитину 5 років в перший день захворювання на скарлатину. При огляді: температура $38,8^{\circ}\text{C}$, блідість носо-губного трикутника. Які клінічні прояви можна ще виявити?

- A** *"Палаючий" зів, дрібноточковий висип на тлі гіперемійованої шкіри
- B** Геморагічний висип зірчастої форми, судоми
- C** Плями Філатова-Копліка на слизовій оболонці, гнійна нежить
- D** Везикульозний висип на волосистій частині голови, схильність до носових кровотеч
- E** Пустульозний висип на гіперемійованій шкірі, гепатоспленомегалія

149

Фельдшер ФАПу оглядає хлопчика 12 років. Мати пояснює, що дитина скаржить на біль в правому підребір'ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати:

- A** *Вірусний гепатит В
- B** Гострий холецистит
- C** Дискінезія жовчовивідних шляхів
- D** Залізодефіцитна анемія
- E** Лейкоз

150

У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник приступ апное, але ціанозу і брадикардії не спостерігається. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

- A** *Тактильна стимуляція вздовж спини
- B** Негайно розпочати ШВЛ
- C** Розпочати зігрівання
- D** Перевірити рівень глюкози в крові
- E** Постійно підтримувати правильне положення

151

Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та встановленої залізодефіцитної анемії з рівнем гемоглобіну 90 г/л призначено комплексне лікування,

зокрема - препаратами заліза. Протягом якого періоду фельдшер ФАПу буде спостерігати за лікуванням дитини?

- A** *6 місяців
- B** 2 місяці
- C** До нормалізації рівня гемоглобіну
- D** 1 рік
- E** 2 роки

152

У 6-місячного малюка при огляді спостерігається ціаноз губ, задишка під час годування і плачу. Додаткове обстеження в кардіологічному відділенні підтвердило діагноз вродженої вади серця. В бесіді з мамою фельдшер визначає, що критичний період формування вади серця протягом вагітності становить:

- A** *2-8 тиждень
- B** На 1-му тижні
- C** Після 12 тижнів
- D** 18-20 тижнів
- E** 30-32 тижні

153

При огляді фельдшером дитини 6 міс на волосистій частині голівки, бровах виявлені лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Як пояснює фельдшер цей симптом?

- A** *Гнейс
- B** Молочний струп
- C** Попрілості
- D** Пітниця
- E** Строфулюс

154

Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

- A** *Везикулопустульоз
- B** Псевдофурункульоз
- C** Пухирчатка новонароджених
- D** Екссфолюативний дерматит Ріттера
- E** Попрілості

155

Фельдшер прийшов на виклик до дитини 5 років, який в течение 2-х днів болює ОРВИ. 2 часа назад появилася мелкопятнистая сыпь розового цвета на неизменённом фоне кожи, не склонна к слиянию, располагается на разгибательных поверхностях конечностей, спине, ягодицах, увеличены затылочные и заднешейные лимфатические узлы до 1,0 см в диаметре. Установите диагноз:

- A** *Краснуха
- B** Корь
- C** Скарлатина
- D** Менингококцемия
- E** Ветряная оспа

156

У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до 39°C, порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфна висипка у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

- A** *Ацикловір
- B** Тавегіл

C Цефтриаксон

D Фулорцин

E "Феністил"